

Aescin żel, 40 g

Cena: 15,45 zł



Opis słownikowy

Dawka	(0,02g+0,05g+50j.m.)/g
Opakowanie	40 g
Postać	żel
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	LEK
Substancja czynna	Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum natricum

Opis produktu

Opis leku:

Aescin żel
1 g żelu zawiera:
alfa-escyna 20 mg,
salicylan dwuetyloaminy 50 mg,
heparyna 50 j.m

Co to jest lek Aescin żel?

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne. Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesiek chłonki. Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, świąd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek, występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

W jakim celu się go stosuje?

Lek Aescin stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym: urazów takich jak stłuczenia i skręcenia, miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku, zapalenia żył kończyn dolnych, krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach, bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Kiedy nie stosować leku Aescin żel?

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz niewydolność nerek
u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży,
miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry,
na obszary skóry poddane napromienianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.