


## Elektrolyty smak truskawkowy 7 saszetek



Cena: 7,75 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	7 sasz.
Postać	prosz.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Elektrolyty rekomendowane przez Stoperan należy stosować przy każdym incydencie biegunki, by efektywnie nawodnić organizm i przywrócić równowagę wodno-elektrolitową:

- mają skład zgodny z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
- obniżona osmolalność produktu do 245 mOsm/l wspomaga przenikanie elektrolitów i wody przez ścianę jelita,
- mają przyjemny truskawkowy smak.

#### Produkt może być stosowany przez:

- osoby z biegunką infekcyjną, w tym wirusową, (np. tzw. grypę żołądkową lub jelitówkę)
- cierpiące na biegunkę przewlekłą,
- kobiety w ciąży i matki karmiące,
- dzieci powyżej 3. roku życia,
- osoby starsze.

#### Sposób użycia:

Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Przez pierwsze 3–4h, podać do 1400 ml płynu (7 saszetek), następnie 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu.

**Składniki (1 saszetka):**

glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Produkt zawiera cukier i substancje słodzące.

**Status:**

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.  
Do postępowania dietetycznego w biegunce i odwodnieniu u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Ważne informacje:**

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest odpowiedni do stosowania pozajelitowego.

**Ostrzeżenia:**

Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. Zawiera źródło fenyloalaniny. Przeciwwskazania: Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

**Podmiot odpowiedzialny:**

USP Zdrowie Sp. z o.o.  
Ul. Poleczki 35  
02-822 Warszawa