

## Fiorda® PROTECT MD spray do gardła, 30ml



Cena: 14,55 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	spray
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis produktu:

Fiorda® PROTECT MD spray do gardła to wyrób medyczny do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia alergicznych i niealergicznych, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych gardła. Wspiera działanie błony śluzowej gardła, w celu ograniczenia wnikania alergenów oraz innych szkodliwych czynników (bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe oraz ich zarodniki, pyły zawieszone w smogu i kurzu). Zawarta w wyrobie opatentowana formuła MUCOBIONETM ułatwia usuwanie zalegającego w gardle śluzu i oczyszcza gardło z alergenów, związków chemicznych i pyłów wchodzących w skład smogu, jak również czynników infekcyjnych (wirusy, bakterie). Dzięki temu osłabia objawy zapalenia gardła różnego pochodzenia. Dodatkowo, zawarty w wyrobie porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła powłokę ochronną, działając kojąco i łagodząco na podrażnione gardło.

#### Składniki – Fiorda® PROTECT MD spray do gardła:

Formuła MUCOBIONETM (ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej i białko owsa), ekstrakt z plechy porostu islandzkiego, ksylitol, guma arabska, kwas cytrynowy, aromat cytryny z limetką, sorbinian potasu, woda.

#### Sposób użycia:

Wyrób medyczny Fiorda® PROTECT MD spray do gardła należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji używania.

Dzieci powyżej 2. roku życia do 6 lat: 1 doza do 3 razy dziennie; dzieci w wieku 7 do 12 lat: 1-2 dozy do 4 razy dziennie; młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 dozy do 5 razy dziennie. Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie ustnej i gardle. Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**Producent:**

Phytopharm Klęka S.A.