FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki
+48 663 303 609

Flegamina o smaku miętowym, syrop 200ml

Cena: 17,04 zł

Opis słownikowy

Dawka	4 mg/5ml
Opakowanie	200 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	LEK
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Opis leku:

Co to jest lek Flegamina o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Syrop Flegamina o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania do stosowania:

ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku miętowym:

- nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.;
- u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas leczenia należy dużo pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
Lek należy stosować ostrożnie w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy.
Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.
Dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym u dzieci poniżej 7 lat.

Jak stosować lek Flegamina o smaku miętowym

Lek należy stosować doustnie.
Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

- dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.
- dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

- rzadko (może dotyczyć 1 na 1000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości, wysypka;
- niezbyt często (może dotyczyć 1 na 100 pacjentów): ból nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka;
- częstość nieznana (częstość występowania nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Flegamina o smaku miętowym

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.
Nie należy stosować leku Flegamina o smaku miętowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Co zawiera lek Flegamina o smaku miętowym

Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek
Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Butelka z brązowego szkła zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.