

Gardlox Manusilver - Spray do gardła roztwór, 30ml



Cena: 20,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	S-LAB SP. Z O. O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Stosowanie preparatu zapewnia skuteczne nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła w podrażnieniach i suchości spowodowanych działaniem zbyt niskich / wysokich temperatur, klimatyzacją, zanieczyszczeniami powietrza, a także w stanach podrażnienia więzadeł głosowych przy ich nadmiernym obciążeniu.

Poprzez tworzenie filmu ochronnego (mechanicznej bariery) na powierzchni błony śluzowej, preparat przywraca naturalną wilgotność, łagodzi obrzęk i wspomaga regenerację błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Właściwości nanocząsteczek srebra oraz miodu Manuka ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych w tym bakterii, wirusów oraz grzybów.

Pomaga utrzymać prawidłowe, naturalne funkcje obronne błony śluzowej. Skutecznie poprawia jakość oddychania, pozostawiając jednocześnie uczucie lekkiego znieczulenia błony śluzowej gardła.

Skład:

Nanokolid srebra, miód Manuka MGO 400 +, porost islandzki, hialuronian sodu, pantenol, gliceryna, glikol polipropylenowy, olejek goździkowy, olejek mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy, aromat czarnej porzeczki, sukraloza, polisorbat 20, poliheksanid, woda.

Instrukcja stosowania:

GARDLOX MANUSILVER należy stosować tylko miejscowo na błony śluzowe gardła.

1. Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Przygotować aplikator. Wstrząsnąć produkt. W przypadku pierwszego użycia, należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik tak, aby wypełnił się płynem.
2. Umieścić aplikator możliwie jak najgłębiej w jamie ustnej, nacisnąć dozownik i rozpylić preparat w kierunku gardła.
3. Po zastosowaniu preparatu nie spożywać żadnych płynów przez 30 minut.

4. Zaleca się po każdym użyciu wytrzeć dozownik suchą jednorazową chusteczką lub gazikiem. Opakowanie jednostkowe powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.

Dawkowanie:

Preparat można stosować do 4 razy dziennie.

Dzieci od 2 roku życia:

Maksymalnie 2 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Dorośli:

Maksymalnie 3-4 rozpylenia przy jednorazowym podaniu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie wyrobu.

Środki ostrożności:

- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze od 5 C do 25 C.
- Może wystąpić naturalny osad lub zmętnienie produktu.

Producent:

S-LAB

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.