Scholl, spray do usuwania kurzajek i brodawek dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych, 80 ml (KRÓTKA DATA do 2022-08-31)

Cena: 40,98 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	80 ml
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Cechy

Skutecznie usuwa kurzajki już przy pierwszym użyciu.
Odpowiedni dla dzieci powyżej 4. roku życia.
Oparty na metodzie zamrażania stosowanej przez lekarzy i specjalistów.

Skuteczne usuwanie kurzajek i brodawek poprzez zamrażanie. Oparty na metodzie zamrażania stosowanej przez lekarzy i specjalistów. Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek skutecznie usuwa kurzajki już przy pierwszym użyciu. Odpowiedni dla dzieci powyżej 4 roku życia. Przeznaczony do 12 zabiegów. Jest to skuteczny i łatwy sposób usuwania pospolitych brodawek i kurzajek. Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek to preparat pozwalający na usuwanie kurzajek i brodawek na zimno. Mechanizm działania oparty jest na metodzie zamrażania ciekłym azotem, która jest stosowana przez lekarzy w szpitalach i klinikach. Produkt nie może być stosowany przez diabetyków i osoby z zaburzeniami krążenia.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Działa poprzez błyskawiczne zamrożenie kurzajki lub brodawki. Po zastosowaniu powstaje mały pęcherz. Kurzajka lub brodawka sama odpada w ciągu 10-14 dni, po czym organizm zastępuje tkankę brodawki zdrową tkanką.

FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki
+48 663 303 609

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy aplikować preparatu kuracji na pojedynczą kurzajkę lub brodawkę więcej niż 4 razy. Chronić przed dziećmi. Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia. Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Zawsze stosować z aplikatorami dostarczonymi przez producenta w oryginalnym opakowaniu. Niewłaściwe użycie produktu może powodować oparzenia, bliznowacenie zdrowych tkanek oraz ślepotę. Unikać wdychania oparów preparatu i używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Ten produkt NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY przez diabetyków oraz osoby ze słabym krążeniem krwi. Skrajnie łatwopalny.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.