FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki
+48 663 303 609

Tonaxinum Forte + Melatonina na noc 60 tabletek KRÓTKA DATA do 2022-02-28

Cena: 24,94 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

TONAXINUM® Forte na NOC to suplement diety zawierający melatoninę, standaryzowany na honokiol ekstrakt z kory magnolii oraz ekstrakty z szyszek chmielu i melisy. Dzięki składnikom pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz wspomaga prawidłowy sen.
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie*. Ponadto przyczynia się do łagodzenia subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej.
Ekstrakt z szyszek chmielu wspomaga prawidłowy sen oraz działa kojąco na układ nerwowy.
Ekstrakt z liści melisy wspomaga odprężenie i zdrowy sen.
Ekstrakt z kory magnolii przyczynia się do utrzymania dobrego samopoczucia fizycznego.
Jedyny produkt w kategorii preparatów na sen, który zawiera ekstrakt z kory magnolii łagodzący objawy menopauzy.

Zastosowanie:

Preparat stosowany jako wsparcie dla osób, które chcą się wyciszyć po dniu pełnym emocji i stresu i/lub mających problemy z zasypianiem.

Dla kogo:

Dla osób dorosłych
*korzystne działanie występuje po spożyciu 1 mg melatoniny na krótko przed snem
korzystne działanie występuje przy spożywaniu 0,5 mg melatoniny krótko przed snem pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży

FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki
+48 663 303 609

Skład:

Ekstrakt z szyszek chmielu (Humulus lupulus), ekstrakt z kory magnolii (Magnolia officinalis) zawierający 2% honokiolu, ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis), celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, sól sodowa karboksymetylocelulozy -substancja spulchniająca, dwutlenek krzemu i stearynian magnezu – substancje przeciwzbrylające, hydroksypropylometyloceluloza – substancja glazurująca, hydroksy-propyloceluloza i kwas stearynowy – substancje przeciwzbrylające, dwutlenek tytanu -barwnik, błękit brylantowy FCF – barwnik, indygokarmina – barwnik.

Stosowanie:

1 – 2 tabletki powlekane raz dziennie.
Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Preparat przyjmować i podczas lub po posiłku pół godziny przed snem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat może osłabiać koncentrację i szybkość reakcji oraz wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przeciwwskazania:

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa