

Xenna Balance Junior, 14 saszetek

Cena: 36,85 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	14 sasz.
Postać	prosz.do sporz.roztw.doust.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Xenna Balance Junior, wyrób medyczny
Proszek do przygotowania roztworu doustnego.
Substancja aktywna: makrogol 3350.

Wskazania:

Leczenie zaparć
Produkt może być stosowany u dzieci od 6. miesiąca życia

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować preparatu Xenna Balance Junior w przypadku:

- zwężenia jelit
- perforacji jelit
- nieswoistego zapalenia jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

Nie przyjmować w przypadku niedrożności jelit.

Nie ma badań dotyczących stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią, dlatego też preparat Xenna Balance Junior może być przyjmowany jedynie w razie konieczności za poradą lekarza. Nie ma konieczności korygowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek. Czas stosowania preparatu Xenna Balance Junior nie powinien przekraczać 2 tygodni. W razie potrzeby leczenie można powtórzyć. Dłuższe stosowanie może być potrzebne w przypadku uporczywych i/lub przewlekłych zaparć, które mogą być spowodowane stosowaniem leków, środków przeciwbólowych (opiodów), leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona

(przeciwocholinergicznym), lub też mogą występować w przypadku takich chorób jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona, które często powodują uporczywe zaparcia.

Możliwe działania niepożądane:

W przypadku stosowania dawek wymaganych do osiągnięcia efektu terapeutycznego, nigdy nie odnotowano żadnych działań niepożądanych. Rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, burczenie w brzuchu, bóle brzucha, nudności i lekkie biegunki (szczególnie na początku stosowania). Rzadko występują reakcje uczuleniowe (wysypka lub pokrzywka).

Dystrybutor:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa, Polska

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.